


Tabac, dentiste, sevrage tabagique et maladie parodontale



Parallèle entre PM et sevrage tabagique



En rouge les parties communes ST et MP

En bleu : le ST En violet : la MP

Atteintes parodontales courantes



Problématiques de surface :

- esthétique
- infection
- déchaussement


Problématiques suite à l'examen :

- perte osseuse
- infection généralisée
- dents condamnées




Échantillon de l'étude réalisée

59 fumeurs de 21 à 76 ans présentant tous des problèmes de gencive




Problèmes buccaux facteurs de motivation ?




motivation en début de soins
non motivés

Qualité de l'info donnée ?

- générale
- sur le questionnaire médicale
- sur le fauteuil de soin



Perte des dents facteur de motivation ?




Qualité de l'info donnée ?

- ciblée
- en consultation
- au bureau, face à face

Mais aussi

- compréhension
- empathie


Modification de la consommation



À la fin du traitement :

- 15 personnes en arrêt
- 15 en réduction
- 19 n'ont rien changé
- 10 ont arrêté et repris


Modification de la consommation



3 mois après la fin des soins :

- 8 personnes en arrêts
- 33 ont diminué
- 18 n'ont rien changé

Parodontologie et tabacologie ?




Réflexions des patients :

- c'est étonnant comme démarche
- à réfléchir
- stress supplémentaire...

Et aussi :

- vous allez arrêter les gencives ?
- vous soignerez que les fumeurs ?

Pourquoi cela (me) paraît possible



En fonction du stade de la maladie = en fonction du nombre de séance



Le sevrage tabagique l'affaire de tous et avec tous les acteurs possibles.



Mais les mêmes difficultés :

- motivation
- coopération
- praticien dépendant
- coût

Merci pour votre attention

et pour ce DIU
devenu indispensable dans mon exercice.

